

## Instrucciones de colonoscopia (SUPREP)

Fecha del procedimiento: \_\_\_\_\_ Seguir: \_\_\_\_\_

**El centro de cirugía llamará con el tiempo 2 días antes de la fecha de su procedimiento**

FACILITY	ADDRESS	PHONE#
ORANGE CITY SURGERY CENTER	975 Town Center Dr Orange City Fl	386-456-5247
LAKE MARY SURGERY CENTER	460 ST Charles Court Lake Mary Fl	407-585-0263
FHC PLANS SURGERY CENTER	2777 Enterprise Rd Orange City Fl	386-481-6282
FL HOSPITAL FISH MEMORIAL	1055 Saxon Blvd Orange City Fl	386-917-5000

- Continuar tomando medicamentos de rutina, incluida la presión arterial y medicamentos para el corazón.
- Si es diabético, solo tome la mitad de su dosis habitual la mañana del procedimiento.
- Antes de suspender cualquier diluyente de sangre, hable con su proveedor de recetas.
- Mantenga Coumadin, Plavix, Effient, Brilinta durante 5 días antes del procedimiento.
- Mantenga Pradaxa, Eliquis y Xarelto durante 2 días antes del procedimiento.
- 5 días antes, descontinúe los suplementos de hierro, las vitaminas o los suplementos de hierbas
- 5 días antes, no tome ninguno: Aleve, Motrin, Naproxen, Ibuprofen - Tylenol es seguro de usar

### **DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:**

**¡No coma ningún alimento sólido todo el día antes del procedimiento!**

Ten una dieta líquida clara durante todo el día. Evite los líquidos que son de color rojo o morado, como la uva roja o el jugo de arándano. Evite TODOS los productos lácteos y jugos con pulpa, como el jugo de naranja o pomelo. Puede beber líquidos claros (SIN COLORES ROJOS / OSCUROS) hasta 3 horas antes del procedimiento. En la marca de 3 horas, nada por la boca incluyendo agua. Puede tomar cualquier medicamento necesario con un pequeño sorbo de agua.

### ***Los líquidos claros incluyen lo siguiente:***

**Sopas:** caldo (pollo, carne de res o vegetal)

**Zumos:** jugo de uva blanca, manzana, etc.

**Postres:** gelatina, hielo italiano, paletas heladas, etc.

**Bebidas deportivas:** Powerade, Gatorade, Propel

**Bebidas:** té, Kool-aid, agua, café negro

If your procedure is before 12PM	If your procedure is After 12PM
1. At 5:00PM, pour (1) 6 ounce bottle of SUPREP liquid into the mixing container. Add cold water to the 16 ounce line and drink all the liquid in the cup.	1. At 7:00PM, pour (1) 6 ounce bottle of SUPREP liquid into the mixing container. Add cold water to the 16 ounce line and drink all the liquid in the cup.
2. Drink (2) more 16 ounce cups of water(or clear liquid) over the next 1 hour.	2. Drink (2) more 16 ounce cups of water(or clear liquid) over the next 1 hour.
3. At 11:00PM, pour (1) 6 ounce bottle of SUPREP liquid into the mixing container.	3. At 6:00 AM, pour (1) 6 ounce bottle of SUPREP liquid into the mixing container. Add

Add cold water to the 16 ounce line and drink all the liquid in the cup.	cold water to the 16 ounce line and drink all the liquid in the cup.
4. Drink (2) more 16 ounce cups of water(or clear liquid) over the next 1 hour.	4. Drink (2) more 16 ounce cups of water(or clear liquid) over the next 1 hour.

**Por favor permita un aviso de 5 días hábiles para la cancelación o habrá un cargo de \$ 200.**